

# Offense-Defense Rating Method



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Kwang-Soo Park



- Entstehung
- OD Rating Methode
- Mathematische Analyse
- Anwendungsbeispiel

# Entstehung



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Hypertext Induced Topic Search (HITS) von Jon Kleinberg, 1999
- Ranking für Webseiten, Vorläufer von PageRank
- Verbindung OD-Methode und Sinkhorn-Knopp Theorem durch Anjela Govan, Amy Langville, Carl Meyer

# Entstehung



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- HITS beruht auf „Hubs and Authorities“
- Graph mit Webseiten als Knoten
- Eine Webseite besitzt „hub rating“ und „authority rating“
  - „hub rating“: Qual./Quan. ausgehender Links
  - „authority rating“: Qual./Quan. eingehender Links
- Beide Ratings voneinander abhängig

# Entstehung - HITS



$$L_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{falls Weg von Knoten } i \text{ zu Knoten } j \text{ existiert} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Zufälligen Ratingvektor (meistens  $a_0 = e$ ) nehmen

„hub rating“ und „authority rating“ iterativ berechnen:

$$a_{(k+1)} = L^T * h_k \quad h_k = L * a_k$$

Abhängigkeiten beheben:

$$a_{(k+1)} = L^T * L * a_k \quad h_{(k+1)} = L * L^T * h_k$$

# Inhalt



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Entstehung
- OD Rating Methode
- Mathematische Analyse
- Anwendungsbeispiel

# Offense-Defense (OD) Rating Methode



- Offensive rating  $o_i > 0$

- Defensive rating  $d_i > 0$

- OD matrix

$$A = [a_{(ij)}] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

- OD Ratings:

$$o_j = \frac{a_{(1j)}}{d_1} + \frac{a_{(2j)}}{d_2} + \dots + \frac{a_{(mj)}}{d_m}$$

große Werte => starke Offensive

$$d_i = \frac{a_{(i1)}}{o_1} + \frac{a_{(i2)}}{o_2} + \dots + \frac{a_{(im)}}{o_m}$$

große Werte => schwache Defensive

# OD Rating Methode



- Starten mit einem Initialvektor  $d_0 = (1, 1, 1, \dots, 1)^T = e$
- Iteratives Berechnen der Sequenzen  $\{d_0, d_1, d_2, \dots\}, \{o_1, o_2, o_3, \dots\}$
- Konvergieren die Sequenzen, dann sind die OD Ratings die Komponenten der Grenzwerte

$$\lim_{k \rightarrow \infty} o_k = o = (o_1, o_2, \dots, o_m)^T \quad \lim_{k \rightarrow \infty} d_k = d = (d_1, d_2, \dots, d_m)^T$$

# OD Rating Methode



- Schreibweise: sei  $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$  dann sei

$$x^{\$} = \left( \frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \dots, \frac{1}{x_m} \right)^T \text{ der Vektor der Kehrwerte}$$

- Dadurch ergibt sich allgemein  $o = A^T * d^{\$}$   $d = A * o^{\$}$

alternierender Prozess (mit Startvektor):

$$o_k = A^T * (d_{(k-1)})^{\$} \quad d_k = A * (o_k)^{\$}$$

# OD Rating Methode



- Beheben der Abhängigkeiten:

$$o_k = A^T * (A * (o_{(k-1)}))^{\$}$$

$$d_k = A * (A^T * (d_{(k-1)}))^{\$}$$

$$o_k = A^T * (d_{(k-1)})^{\$}$$

$$d_k = A * (o_k)^{\$}$$

- Kombinieren zum Gesamtrating

$$r_i = \frac{o_i}{d_i}$$

# OD Rating Methode Bsp.



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} DUKE & MIAMI & UNC & UVA & VT \end{matrix} \\ \begin{matrix} DUKE \\ MIAMI \\ UNC \\ UVA \\ VT \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 52 & 24 & 38 & 45 \\ 7 & 0 & 16 & 17 & 7 \\ 21 & 34 & 0 & 5 & 30 \\ 7 & 25 & 7 & 0 & 52 \\ 0 & 27 & 3 & 14 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Nach k=9 Iterationen...

Rank	Team	Overall Rating
1	VT	279.8
2	MIAMI	188.8
3	UVA	84.8
4	UNC	41.8
5	DUKE	20.1

Team	Off. Rating (rank)	Def. Rating (rank)
DUKE	33.99 (5)	1.691 (5)
MIAMI	151.6 (1)	0.8029 (2)
UNC	48.66 (4)	1.164 (4)
UVA	82.05 (3)	0.9675 (3)
VT	114.8 (2)	0.4104 (1)

# OD Rating Methode Bsp.



- Statt Punkte andere Statistiken (z.B. yards gained, average points per game etc.)

Nach k=6 Iterationen...

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} DUKE & MIAMI & UNC & UVA & VT \end{matrix} \\ \begin{matrix} DUKE \\ MIAMI \\ UNC \\ UVA \\ VT \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 557 & 357 & 315 & 362 \\ 100 & 0 & 188 & 452 & 167 \\ 209 & 321 & 0 & 199 & 338 \\ 207 & 500 & 270 & 0 & 552 \\ 35 & 304 & 196 & 334 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Rank	Team	Yards Rating
1	MIAMI	2016
2	VT	1885
3	UVA	1096
4	UNC	1036
5	DUKE	451.6

Team	Off. Rating (rank)	Def. Rating (rank)
DUKE	537.3 (5)	1.1900 (4)
MIAMI	1608 (1)	0.7975 (2)
UNC	1024 (4)	0.9886 (3)
UVA	1537 (2)	1.4020 (5)
VT	1249 (3)	0.6629 (1)

# Inhalt



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Entstehung
- OD Rating Methode
- **Mathematische Analyse**
- Anwendungsbeispiel

# Mathematische Analyse



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Wenn die OD Sequenzen nicht konvergieren, existieren keine Ratings

$$\lim_{k \rightarrow \infty} o_k = o = (o_1, o_2, \dots, o_m)^T \quad \lim_{k \rightarrow \infty} d_k = d = (d_1, d_2, \dots, d_m)^T$$

- Sinkhorn-Knopp Theorem! → OD Theorem!
- Um Konvergenz zu zeigen, benötigen wir mehr mathematische Definitionen (Sinkhorn-Knopp Prozess, Diagonale)

# Mathematische Analyse

## Sinkhorn-Knopp Prozess



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- OD Methode hängt mit schrittweiser Skalierung bzw. Ausgleichen der Matrix  $A$  zusammen
- Erst Spaltenskalierung: Spaltensummen sind 1  
danach Zeilenskalierung: Zeilensummen sind 1
- Mathematisch ausgedrückt:

Multiplikation mit zwei diagonalen Skalierungsmatrizen  $C_1, R_1$ ,  
sodass in  $A * C_1$  alle Spaltensummen 1 und in  $R_1 * (A * C_1)$  alle  
Zeilensummen 1 sind

# Mathematische Analyse

## Sinkhorn-Knopp Prozess



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Wenn:

$$C_1 = \begin{pmatrix} \xi_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \xi_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & \xi_m \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \xi_i = \frac{1}{[e^T * A]_i} \quad \text{(Inverse der i-ten Spaltensumme)}$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} \rho_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \rho_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & \rho_m \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \rho_i = \frac{1}{[(A * C_1) * e]_i} \quad \text{(Inverse der i-ten Zeilensumme)}$$

Dann gilt:  $R_1 * A * C_1 * e = e$

# Mathematische Analyse

## Sinkhorn-Knopp Prozess



Bsp:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^T * A = (1 \quad 1 \quad 1) * \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (5 \quad 3 \quad 7)$$

$$A * C_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 3/7 \\ 4/5 & 0 & 4/7 \\ 1/5 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A * C_1) * e = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 3/7 \\ 4/5 & 0 & 4/7 \\ 1/5 & 1/3 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23/21 \\ 48/35 \\ 8/15 \end{pmatrix}$$

$$R_1 * A * C_1 = \begin{pmatrix} 21/23 & 0 & 0 \\ 0 & 35/48 & 0 \\ 0 & 0 & 15/8 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 3/7 \\ 4/5 & 0 & 4/7 \\ 1/5 & 1/3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 14/23 & 9/23 \\ 7/12 & 0 & 5/12 \\ 3/8 & 5/8 & 0 \end{pmatrix}$$

# Mathematische Analyse

## Sinkhorn-Knopp Prozess



- Spalten- und Zeilensummen nicht immer 1
- Alternierendes Skalieren wiederholen bis

$$S_k = R_k * \dots * R_2 * R_1 * A * C_1 * C_2 * \dots * C_k \quad S_k * e = e$$

- Matrix  $S$  heißt stochastisch, wenn sie nicht-negative Elemente besitzt und alle Zeilensummen = 1
- Sind dazu noch die Spaltensummen = 1, dann ist  $S$  doppelt stochastisch
- Also:  $S_k$  ist doppelt stochastisch

# Mathematische Analyse

## Diagonale



- Es gibt mehr als nur die Hauptdiagonale
- Sei  $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m)$  eine Permutation, dann ist die *Diagonale von A zu  $\sigma$*  so definiert:  $\{a_{(1\sigma_1)}, a_{(2\sigma_2)}, \dots, a_{(m\sigma_m)}\}$

Bsp:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Permutation	allgemein	Diagonale
(1, 2, 3)	$\{a_{11}, a_{22}, a_{33}\}$	{1, 5, 9}
(1, 3, 2)	$\{a_{11}, a_{23}, a_{32}\}$	{1, 6, 8}
(2, 1, 3)	$\{a_{12}, a_{21}, a_{33}\}$	{2, 4, 9}
(2, 3, 1)	$\{a_{12}, a_{23}, a_{31}\}$	{2, 6, 7}
(3, 1, 2)	$\{a_{13}, a_{21}, a_{32}\}$	{3, 4, 8}
(3, 2, 1)	$\{a_{13}, a_{22}, a_{31}\}$	{3, 5, 7}

# Mathematische Analyse

## Sinkhorn-Knopp Theorem



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Sei  $A$  eine nicht-negative Matrix.

- Prozess der Spalten- und Zeilenskalierung konvergiert gegen einen doppelt stochastischen Grenzwert  $S$   $\Leftrightarrow$

In  $A$  existiert mindestens eine strikt positive Diagonale. Dann sagt man  $A$  wird unterstützt. („ $A$  is said to have support“)

(Das ist für  $S_k$ , aber was ist mit den Produkten

$$\hat{C}_k = C_1 * C_2 * \dots * C_k \quad ?)$$
$$\hat{R}_k = R_k * \dots * R_2 * R_1$$

- Die Grenzwerte

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \hat{C}_k = C \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \hat{R}_k = R$$

existieren und  $R * A * C = S$  ist doppelt stochastisch  $\Leftrightarrow$

Jedes positive Element in  $A$  liegt auf einer positiven Diagonale. Dann sagt man  $A$  wird vollständig unterstützt. („ $A$  is said to have total support“)

# Mathematische Analyse

## OD Theorem



- Anwendung Sinkhorn-Knopp auf OD Rating

- Notation: 
$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \iff \text{diag}\{x\} = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_m \end{pmatrix}$$

- Eigenschaften für Matrix D und Vektor v ohne Nullelemente:

$$\text{diag}\{(D*v)^{\$}\} = D^{-1} * \text{diag}\{v^{\$}\} \quad \text{diag}\{(D*v^{\$})^{\$}\} = D^{-1} * \text{diag}\{v\}$$

- OD Theorem:

Für eine OD Matrix A konvergieren die OD Sequenzen

$$o_k = A^T * (d_{(k-1)})^{\$} \quad d_k = A * (o_k)^{\$}$$

gegen die Vektoren o und d  $\iff$  A wird vollständig unterstützt

# Mathematische Analyse

## OD Theorem Beweis



$$\hat{C}_k = C_1 * C_2 * \dots * C_k \quad \hat{R}_k = R_k * \dots * R_2 * R_1$$

- Beweisidee: Verbindung zwischen OD Sequenzen und diesen Produkten herstellen

$$C_1 = \text{diag}\{(A^T * e)^{\$}\}$$

$$R_1 = \text{diag}\{(A * C_1 * e)^{\$}\}$$

$$\xi_i = \frac{1}{[e^T * A]_i}$$

$$C_2 = \text{diag}\{((R_1 * A * C_1)^T * e)^{\$}\}$$

$$R_2 = \text{diag}\{(R_1 * A * C_1 * C_2 * e)^{\$}\}$$

$$\rho_i = \frac{1}{[(A * C_1) * e]_i}$$

usw.

- Die Produkte können anders ausgedrückt werden:

$$\hat{C}_k = \text{diag}\{c_k\} \quad \hat{R}_k = \text{diag}\{r_k\}$$

mit  $r_0 = e$

$$c_k = (A^T * r_{(k-1)})^{\$} \quad r_k = (A * c_k)^{\$}$$

für  $k=1,2,\dots$

# Mathematische Analyse

## OD Theorem Beweis



- Iterativer Nachweis von  $\hat{C}_k = \text{diag}\{c_k\}$   $\hat{R}_k = \text{diag}\{r_k\}$  :

$$c_1 = (A^T * e)^{\$} \Rightarrow C_1 = \text{diag}\{c_1\} \text{ und } C_1 * e = c_1$$

$$R_1 = \text{diag}\{(A * C_1 * e)^{\$}\} = \text{diag}\{(A * c_1)^{\$}\} = \text{diag}\{r_1\}$$

$$C_2 = \text{diag}\{((R_1 * A * C_1)^T * e)^{\$}\} = \text{diag}\{(C_1 * A^T * R_1 * e)^{\$}\} = \text{diag}\{(C_1 * A^T * r_1)^{\$}\} = \text{diag}\{(C_1 * c_2^{\$})^{\$}\} = C^{-1} * \text{diag}\{c_2\}$$

$$\Rightarrow \hat{C}_2 = C_1 * C_2 = \text{diag}\{c_2\}$$

$$R_2 = \text{diag}\{(R_1 * A * C_1 * C_2 * e)^{\$}\} = \text{diag}\{(R_1 * A * c_2)^{\$}\} = \text{diag}\{(R_1 * r_2^{\$})^{\$}\} = R^{-1} * \text{diag}\{r_2\}$$

$$\Rightarrow \hat{R}_2 = R_1 * R_2 = \text{diag}\{r_2\}$$

# Mathematische Analyse

## OD Theorem Beweis



- Bemerkung: Die Sequenzen  $c_k = (A^T * r_{(k-1)})^{\$}$   $r_k = (A * c_k)^{\$}$  sind die Kehrwerte der OD Sequenzen:

$$c_k = o_k^{\$} \quad r_k = d_k^{\$}$$

- Iterativer Nachweis:

$$c_1 = (A^T * e)^{\$} \quad \text{und} \quad o_1 = A^T * e^{\$} = A^T * e \quad \Rightarrow \quad c_1 = o_1^{\$}$$

$$r_1 = (A * c_1)^{\$} \quad \text{und} \quad d_1 = A * o_1^{\$} = A * c_1 \quad \Rightarrow \quad r_1 = d_1^{\$}$$

$$c_2 = (A^T * r_1)^{\$} \quad \text{und} \quad o_2 = A^T * d_1^{\$} = A^T * r_1 \quad \Rightarrow \quad c_2 = o_2^{\$}$$

$$r_2 = (A * c_2)^{\$} \quad \text{und} \quad d_2 = A * o_2^{\$} = A * c_2 \quad \Rightarrow \quad r_2 = d_2^{\$}$$

# Mathematische Analyse

## OD Theorem Beweis



- Sinkhorn-Knopp sagt  $\lim_{k \rightarrow \infty} \hat{C}_k = C$   $\lim_{k \rightarrow \infty} \hat{R}_k = R$   
existieren genau dann, wenn  $A$  vollständig unterstützt wird.
- Mit  $\hat{C}_k = \text{diag}\{c_k\}$   $\hat{R}_k = \text{diag}\{r_k\}$  gilt  
 $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \hat{C}_k * e = C * e$   $\lim_{k \rightarrow \infty} r_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \hat{R}_k * e = R * e$   
existieren genau dann, wenn  $A$  vollständig unterstützt wird.
- Folglich geht aus  $c_k = o_k^{\$}$   $r_k = d_k^{\$}$  hervor, dass  
 $\lim_{k \rightarrow \infty} o_k = \lim_{k \rightarrow \infty} c_k^{\$} = C^{-1} * e$   $\lim_{k \rightarrow \infty} d_k = \lim_{k \rightarrow \infty} r_k^{\$} = R^{-1} * e$   
existieren genau dann, wenn  $A$  vollständig unterstützt wird.

# Mathematische Analyse

## Konvergenz



- Nicht jede OD Matrix wird vollständig unterstützt => keine Konvergenz => OD Ratings existieren nicht!
- Konvergenz der OD Matrix erzwingen → „cheating“
- kleine Zahl  $\varepsilon > 0$  auf jedes Element in A addieren, sodass jedes Element  $> 0$  => vollständig unterstützt!

$$A \leftarrow A + \varepsilon * e * e^T > 0$$

- Feineres „cheaten“ (nicht auf Hauptdiagonale addieren):

$$A \leftarrow A + \varepsilon * (e * e^T - I)$$

- Je kleiner  $\varepsilon$ , desto mehr Iterationen nötig → längere Laufzeit

# Inhalt



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Entstehung
- OD Rating Methode
- Mathematische Analyse
- Anwendungsbeispiel

# Anwendungsbeispiel



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Offense-Defense Rating Methode in Spielvorhersagen (game predictions)
- Tests mit NFL (32 Teams), NCAA Football (120 Teams, relativ wenige Spiele) und NCAA Basketball (341 Teams, ~30 Spiele/Saison) für mehrere Saisons
- „Foresight“ predictions: intuitiv
- „Hindsight“ predictions: nutzt Daten der ganzen Saison um Spieler der Saison vorherzusagen (eher theoretisch)

# Anwendungsbeispiel

## NFL



	Colley	Keener	Massey	ODM	Colley	Keener	Massey	ODM
2001	57.92	58.69	60.23	60.62	72.97	72.97	69.88	69.88
2002	59.18	58.43	60.3	63.3	68.16	68.91	67.04	68.54
2003	63.3	58.05	64.04	61.05	75.66	73.78	71.91	72.28
2004	61.8	59.93	62.17	58.43	74.16	70.79	67.42	68.54
2005	61.8	62.55	65.17	64.04	73.03	75.66	75.28	76.4
2006	58.8	57.68	60.3	58.05	72.66	69.29	71.16	70.04
2007	66.67	62.55	68.16	68.91	75.66	76.03	73.41	72.28

Table 1: Foresight/Hindsight game prediction percentages for the NFL.

# Anwendungsbeispiel

## NCAA Football



- „Foresight“ für Regular Season (ab Woche 6, da keine pre-Season), nur Division I-A, zwischen I-A und I-AA entfernt)

	Colley	Keener	Massey	ODM	Colley	Keener	Massey	ODM
2003	66.3	70.29	69.62	69.18	82.04	76.72	77.38	76.05
2004	66.14	63.68	67.71	67.49	81.17	77.8	76.91	79.15
2005	67.34	64.21	67.79	64.43	81.66	77.63	76.06	74.27
2006	68.74	65.74	73.23	71.95	82.23	78.37	77.09	77.3
2007	67.1	68.82	69.89	68.6	79.35	76.77	77.42	75.48

Table 2: Foresight/Hindsight game prediction percentages for NCAA football.

# Anwendungsbeispiel

## NCAA Basketball



- Größtes Beispiel, da mehrere Spiele/Woche
- „Foresight“ ab Spieltag 26, da keine pre-Season

	Colley	Keener	Massey	ODM	Colley	Keener	Massey	ODM
2001	68.60	64.60	69.65	70.03	76.00	70.03	74.40	74.11
2002	69.02	64.79	70.13	70.03	75.97	70.42	74.50	74.37
2003	68.92	64.92	70.19	70.22	76.90	70.13	75.83	75.66
2004	68.65	65.27	70.50	70.12	76.27	70.65	74.99	74.97
2005	66.98	64.44	68.95	69.56	75.99	69.32	74.80	74.57
2006	68.37	64.84	70.02	69.69	76.37	69.88	74.83	74.77
2007	68.28	64.91	70.13	70.07	76.05	69.82	74.92	74.83

Table 3: Foresight/Hindsight game prediction percentages for NCAA basketball.

# Anwendungsbeispiel

## CPU Time



	Colley	Keener	Massey	ODM $\epsilon = 10^{-3}$	ODM $\epsilon = 10^{-4}$	ODM $\epsilon = 10^{-5}$
2001	1.78125	162.90625	2.0625	0.90625	0.953125	0.9375
2002	1.5625	161.234375	2.015625	0.84375	0.921875	1.1875
2003	1.671875	167.609375	2.125	1.03125	1.0625	1.125
2004	1.796875	170.046875	2.09375	1.03125	0.90625	0.875
2005	1.84375	174.96875	2.03125	1.109375	1.03125	1.140625
2006	1.96875	181.5	2.1875	0.90625	0.953125	1.03125
2007	2.03125	207.09375	2.453125	1.140625	1.1875	1.203125

Table 4: Total cpu time (sec) for each of the methods on NCAA basketball.

	$\epsilon = 0.001$	$\epsilon = 0.0001$	$\epsilon = 0.00001$
2001	1576	1577	1577
2002	1690	1866	2174
2003	1622	2000	2619
2004	1515	1605	1745
2005	1748	1997	2402
2006	1421	1465	1532
2007	1555	1638	1776

Table 5: Total number of iterations used by ODM for each of the seasons on NCAA basketball.

# Weitere Anwendungsbeispiele



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Individuelle Spielerauszeichnungen (berücksichtigt Offense + Defense)
- Anwendung seitens der Autoren: Netflix.com, Movie Rankings
  - Film  $i$  hat hohes Rating  $m_i$ , wenn „gute“ User (z.B. #Bewertungen  $> 1000$ ) diesen hoch bewerten
  - User  $j$  hat hohes Rating  $u_j$ , wenn seine Movie-Ratings mit dem „echten“ Rating übereinstimmen

# Fazit



- OD Rating Methode ist in „foresight predictions“ mindestens genauso gut wie andere Rating Methoden
- Verbraucht weniger Zeit als andere Rating Methoden
- nicht nur im Wettbewerbssport, auch in anderen Ranking-Anwendungen verwendbar
- Adaptivität mit anderen Statistiken
- Konvergenz garantiert



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

# Referenzen



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Anjela Y. Govan, Amy N. Langville and Carl D. Meyer. The offense-defense approach to ranking team sports, J. of Quantitative Analysis in Sports, 5 (2009), Article 4
- A. N. Langville and C. D. Meyer. Who's #1: The Science of Rating and Ranking
- Anjela Y. Govan. Ranking Theory with Application to Popular Sports. Ph. D. Thesis, North Carolina State University, 2008.